




A **Groot dooiermos** - *Xanthoria parietina*
een grote, gele, bladvormige soort met opvallende
oranje vruchtlichamen.



A **Vals dooiermos** - *Candelaria concolor*
een kleine, sterk vertakte, groengele, bladvormige
soort.



A **Poedergeelkorst** - *Candelariella reflexa*
een knalgele, korstvormige soort die vaak in brede,
verticale banen langs de stam groeit.

BLWG

maatstreep foto's: 5 mm

Effecten van ammoniak kunnen alleen bepaald worden aan
de hand van korstmossen op laanbomen

KORSTMOSSEN DIE VAN AMMONIAK HOUDEN

Doe mee aan het onderzoek!
Scan de QR-code of kijk op
blwg.nl/stikstof



B **Heksenvingermos** - *Physcia tenella*
een kleine, grijze, bladvormige soort met kleine
worteltjes aan de randen. De uiteinden zijn poederig.



B **Rond schaduwmos** - *Phaeophyscia orbicularis*
een donkergrijze, bladvormige soort die
poederhoopjes vormt in het midden van de rozetten.



B **Kapjesvingermos** - *Physcia adscendens*
een kleine, grijze, bladvormige soort met wortels en
rechtopstaande, lichter gekleurde kapjes.





C **Gewoon schorsmos** - *Hypogymnia physodes*
een grote, grijze, bladvormige soort met dikke, holle lobben. Vaak met hoopjes poeder en zwarte spikkels.



C **Groen boomschildmos** - *Flavoparmelia soredians*
een grote, grijsgroene, bladvormige soort. In het midden met poederige plekken.



C **Gewoon schildmos** - *Parmelia sulcata*
een grote, grijze, bladvormige soort met dunne, platte lobben met daarop witte streepjes.

BLWG

maatstreep foto's: 5 mm

KORSTMOSSEN DIE VERDWIJNEN DOOR AMMONIAK

Schildmossen (C) en takmos (D) verdwijnen bij grotere hoeveelheden ammoniak

D **Eikenmos** - *Evernia prunastri*
een groengrijze, struikvormige soort met afgeplatte takken die aan de onderzijde wit zijn.



D **Melig takmos** - *Ramalina farinacea*
een groene, struikvormige soort met spitse toppen. Vaak met ronde plekjes met fijn poeder.



D **Gewoon baardmos** - *Usnea subfloridana*
een groene, struikvormige soort. op de foto samen met het grijze Eikenmos.

